



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
UNITATEA FITOSANITARA
TARGOVISTE, STR. I.C.BRATIANU, NR. 29
TEL/FAX:0245221026
E-mail: prognozadb@yahoo.com

Nr. 11 din 14.04.2015

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: rapan tr. II, monilioza, pureci meliferi, alți daunători care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

PAR

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- tratament de siguranță înainte de înflorit;

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- Chorus 50WG – 0,03% + Movento – 0,1875%;
- Dithane M45 – 0,2% + Vertimec 1,8% EC – 0,1%;
- Merpan 80 WDG – 0,15% + Nurelle D 50/500 EC – 0,075%;

Tratamentul se va aplica în fenofaza de înfoierea corolei – primele flori deschise.

Tratamentul se aplica pe timp liniștit, fără vânt, la temperaturi peste 6°C, începându-se cu soiurile mai avansate în vegetație.

Pentru protecția mediului înconjurător luați toate măsurile ce se impun, respectați cu strictete frazele de risc înscrise pe ambalajul produselor de protecția plantelor.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor (pesticide), veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de “înflorire” pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor

Intocmit
ing. Serban V.