

Nr. 16 din 27.04.2015

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: viespea cu ferastrau (Hoplocampa minuta), primii adulți de Eurythoma, monilioza, ciuruire, patarea roșie a frunzelor, plum-pox, care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

PRUN

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- 2% flori cu pontă;
- rezerva biologică de agenți patogeni;

Folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- Karate Zeon – 0,015% + Merpan 50 WP – 0,25%
- Calypso 480 SC – 0,02% + Dithane M 45 – 0,2%;
- Fastac 10EC – 0,02% + Signum – 0,05%;
- Decis Mega 50EW – 0,015% + Bravo 500SC – 0,15%

Tratamentul se va aplica: - când 10 -15% din flori au început să-și scuture petalele.

- se vor aplica încă două tratamente succesive la 8 – 10 zile diferență pt viespea neagră a prunului (Eurythoma schreineri)

Tratamentul se aplică pe timp liniștit, fără vânt.

Pentru protecția mediului inconjurator luați toate măsurile ce se impun, respectați cu strictețe frazele de risc înscrise pe ambalajul produselor de protecția plantelor.

Având în vedere începerea sezonului apicol activ, se impune necesitatea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor (pesticide), veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de “înflorire” pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Intocmit
Ing. Serban V.