

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: monilioza, antracnoza, ciuruire, afide, insecte defoliatoare, care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

CIRES + VISIN

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- rezerva biologică agenți patogeni și daunători;
- condiții optime de temperatură și precipitații

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- Signum – 0,05% + Calypso 480 SC – 0,02%;
- Folicur Solo 250 EW – 0,1% + Karate Zeon – 0,015%;
- Antracol 70 WP – 0,3% + Actara 25 WG – 0,01%;

Tratamentul se va aplica în fenofaza de scuturare a petalelor

Tratamentul se aplica pe timp liniștit, fără vânt, începându-se cu soiurile mai avansate în vegetație.

Pentru protecția mediului înconjurător luați toate măsurile ce se impun, respectați cu strictețe frazele de risc înscrise pe ambalajul produselor de protecția plantelor.

Având în vedere începerea sezonului apicol activ, se impune necesitatea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor (pesticide), veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de “înflorire” pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Intocmit
Ing. Serban V.