



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEVZOLTARII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA  
OFICIUL FITOSANITAR JUDETEAN DAMBOVITA  
tel./fax: 0245221026  
e-mail: [prognozadb@yahoo.com](mailto:prognozadb@yahoo.com)

Nr. 38 din 25.06.2015

BULETIN DE AVERTIZARE

Conditiiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii: vierme mar G II, tr. I + II, molii miniere, afide, acarieni, rapan tr. IX + X, fainare tr. X + XI, care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

**MAR**

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:

- maximul curbei de zbor;
- conditii optime de temperatura si precipitatii;

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz:

- Coragen – 0,15 l/ha + Belis – 0,8 l/ha + Dithane Neotec – 3 kg/ha;
- Calypso 480 SC – 0,3 l/ha + Flint Plus 64 WG – 1,875 kg/ha;
- Insegar 25 WG – 0,45 kg/ha + Topsin 70 WDG – 1,05 kg/ha + Merpan 80WDG – 2,25 kg/ha;
- Proteus OD 110 – 0,75 l/ha + Maccani – 2,25 kg/ha + Delan700 WDG – 0,75 kg/ha;
- Voliam Targo – 1,1 l/ha + Topsin 500 SC – 2,1 l/ha + Dithane M45 – 3kg/ha;
- Decis Mega 50 EW – 0,225 l/ha + Shavit F 72 WDG – 3 kg/ha;

Pe solele pe care se inregistreaza atac de acarieni se va adauga unul din acaricidele: Envidor 240 SC – 0,6 l/ha sau Sanmite 20WP – 0,75 - 1,125 kg/ha sau Milbecnock EC – 0,75 l/ha;

Pe solele pe care se inregistreaza atac de Erwinia amylovora va recomandam sa faceti igiena pomilor prin: taierea ramurilor uscate la cca 50 cm sub uscatura cu foarfeca dezinfectata in hipoclorit de sodiu, strangerea ramurilor intr-un sac si arderea lor.

Tratamentul se aplica in perioada:

- tr. I – 29.06. – 03.07.2015
- tr.II – 09 – 13.07.2015

Intocmit,  
ing. Serban Victoria