



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

UNITATEA FITOSANITARA

TARGOVISTE, STR. I.C.BRATIANU, NR. 29

TEL/FAX:0245221026

E-mail: prognozadb@yahoo.com

Nr. 15 din 14.04.2014

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: rapan tr. III, monilioza, pureci meliferi, alți daunători care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

PAR

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- tratament de siguranță după înflorit;

Folositi unul din amestecurile de mai jos, după caz:

- Antracol 70WP – 0,25% + Movento – 0,1875%
- Bravo – 0,15% + Vertimec – 0,1%
- Merpan 50 WP – 0,25% + Mospilan 20 SP – 0,02%;

Tratamentul se va aplica în fenofaza: 10 – 15% din flori au început să-și scuture petalele..

Tratamentul se aplica pe timp liniștit, fără vânt..

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor (pesticide), veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de “înflorire” pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Intocmit
ing. Serban V.

Pentru difuzare în teritoriu, afisare la primarie și instiintarea cetatenilor.