



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

UNITATEA FITOSANITARA

TARGOVISTE, STR. I.C.BRATIANU, NR. 29

TEL/FAX:0245221026

E-mail: prognozadb@yahoo.com

Nr.7 din 03.04.2015

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii: *Quadraspidotus perniciosus* – larve hibernante, oua acarieni, oua afide, diferite boli.

SEMINTOASE (MAR, PAR)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- urechișua de soarece;

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

MOSPILAN 20 SG – 0,03% (0,45KG/HA) + TOIL – 0,5% + ALCUPRAL 50 PU – 0,3% (4,5 KG/HA)

Tratamentul se va aplica în fenofaza de urechișua de soarece.

Tratamentul se aplica pe timp liniștit, fără vânt, la temperaturi peste 6°C, începându-se cu soiurile mai avansate în vegetație.

Pentru protecția mediului înconjurător luați toate măsurile ce se impun, respectați cu strictețe frazele de risc înscrise pe ambalajul produselor de protecția plantelor.

RECOMANDARE: VA RUGĂM SĂ FOLOSITI NUMAI PRODUSE OMOLOGATE PENTRU BOLILE ȘI DAUNATORII MENTIONAȚI ÎN BULETINUL DE AVERTIZARE ȘI SĂ COMPLETAȚI REGISTRUL DE EVIDENȚĂ AL TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor (pesticide), veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de “înflorire” pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor

Intocmit,
ing. Serban V.