



Nr. 34 din 12.06.2014

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: paduchele din San-Jose G I tr. I + II, afide, molii miniere, rapan tr. VII + VIII, fainare tr. VIII + IX, monilioza, care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

MAR + PAR

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- apariția larvelor mobile pe ramuri;
 - condiții optime de temperatură și precipitații
- Folositi unul din amestecurile de mai jos, după caz:

- Pyrinex Quick – 0,1% + Flint Plus 64 WG – 0,125%;
- Calypso 480 SC – 0,02% + Folicur Solo 250 EW – 0,05% + Folpan 80 WDG – 0,15%;
- Actara 25 WG – 0,01% + Embrelia – 0,1%;
- Dantop 50 WG – 0,02% + Topsin 70 WDG – 0,07% + Merpan 80 WDG – 0,15%;
- Trebon 30 EC – 0,03% + Luna Experience 400 SC – 0,05% + Merpan 50 WP – 0,25%;
- Movento 100 SC – 0,125% + Systhane Forte – 0,02% + Dithane M 45 – 0,2%;

Pe solele pe care se înregistrează atac de acarieni se va adăuga unul din acaricidele:

Envidor 240 SC – 0,04% sau Milbecnock EC – 0,05% sau Sanmite 20WP – 0,075%

Tratamentul se aplică în perioada:

- tr. I – 13.06. – 17.06.2014;
- tr. II – 23.06. – 27.06.2014;

Intocmit,
ing Serban Victoria