



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA  
UNITATEA FITOSANITARA  
TARGOVISTE, STR. I.C.BRATIANU, NR. 29  
TEL/FAX:0245221026  
E-mail: prognozadb@yahoo.com

Nr. 27 din 27.05.2014

### BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: Musca cireselor (*Rhagoletis cerasi*), diferiți daunători, monilioza, antracnoza, ciuruire, care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

#### CIRES + VISIN

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- rezerva de boli și daunători;
- condiții optime de temperatură și precipitații;

Folosiți unul din amestecurile de mai jos, după caz:

- Calypso 480 SC – 0,02% + Signum – 0,05%;
- Decis Mega 50EW – 0,015% + Rovral 500 SC – 0,1%;
- Fastac 10 EC - 0,015% + Folicur Solo – 0,1%;
- Karate Zeon – 0,015% + Dithane M 45 – 0,2%;

Tratamentul se va aplica la intrarea în pargă a soiurilor timpurii și se va repeta la 8 – 10 zile.  
Nu se vor trata soiurile aflate în pargă – coacere.

Intocmit,  
Ing. Serban Victoria