



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
UNITATEA FITOSANITARA
TARGOVISTE, STR. I.C.BRATIANU, NR. 29
TEL/FAX:0245221026
E-mail: prognozadb@yahoo.com

Nr. 38 din 14.07.2014

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: vierme mar G II, tr. I + II, molia pielitei, molii miniere, afide, acarieni, rapan tr. X + XI, fainare tr. XI + XII, care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

MAR

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- maximul curbei de zbor;
 - condiții optime de temperatură și precipitații;
- Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz:

- Coragen – 0,01% + Topsin 70 WDG – 0,07% + Merpan 80WDG – 0,15%;
- Calypso 480 SC – 0,02% + Topsin 500 SC – 0,14% + Folpan 80 WDG – 0,15%
- Voliam Targo – 0,07% + Systhane Forte – 0,02% + Dithane M 45 – 0,2%;
- Reldan 22 EC – 0,15% + Flint Plus 64 WG – 0,125%
- Proteus OD 110 – 0,05% + Shavit F 72 WDG – 0,2%

Pe solele pe care se înregistrează atac de acarieni se va adăuga unul din acaricidele: Sanmite – 0,075% sau Milbeknock 0,05% .

Tratamentul se aplică în perioada:

- tr. I – 14 – 18.04.2014
- tr. II – 24 – 28.04.2014

Intocmit, ing. Serban Victoria