



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

UNITATEA FITOSANITARA

TARGOVISTE, STR. I.C.BRATIANU, NR. 29

TEL/FAX:0245221026

E-mail: prognozadb@yahoo.com

Nr. 9 din 01.04.2014

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: rapan tr. II, monilioza, pureci meliferi, alți daunători care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

PAR

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- tratament de siguranță înainte de înflorit;

Folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- Merpan 80 WDG – 0,15% + Movento – 0,1875%;
- Dithane M45 – 0,2% + Vertimec 1,8% EC – 0,1%;
- Merpan 50 WP – 0,25% + Nurelle D 50/500 EC – 0,075%;

Tratamentul se va aplica în fenofaza de înfiorarea corolei – primele flori deschise.

Tratamentul se aplica pe timp liniștit, fără vânt, la temperaturi peste 6°C, începându-se cu soiurile mai avansate în vegetație.

Pentru protecția mediului înconjurător luați toate măsurile ce se impun, respectați cu strictețe frazele de risc înscrise pe ambalajul produselor de protecția plantelor.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor (pesticide), veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de "înflorire" pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor

