



Nr. 40 din 01.08.2014

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: paduchele din San-Jose G II tr. I + II, afide, molii miniere, rapan tr. XII + XIII, fainare tr. XIII + XIV, monilioza, care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

MAR + PAR

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- apariția larvelor mobile pe ramuri;
 - condiții optime de temperatură și precipitații
- Folositi unul din amestecurile de mai jos, după caz:

- Pyrinex Quick – 0,1% + Flint Plus 64 WG – 0,125%;
- Trebon 30 EC – 0,03% + Topsin 70 WDG – 0,07% + Merpan 80 WDG – 0,15%;
- Movento 100 SC – 0,125% + Shavit 72 WDG – 0,2%;
- Dantop 50 WG – 0,02% + Topsin 500SC – 0,14% + Folpan 80 WDG – 0,15%;
- Calypso 480 SC – 0,02% + Shavit 72 WDG – 0,2%;

Pe solele pe care se înregistrează atac de acarieni se va adăuga unul din acaricidele:
Milbecnock EC – 0,05% sau Sanmite 20WP – 0,075%

Tratamentul se aplică în perioada:

- tr. I – 04 - 08.08.2014;
- tr. II – 14 - 18.08.2014;

Intocmit,
ing Serban Victoria